

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO OCUPACIONAL

SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES (SBIIm) 2006/2007

VACINAS ESPECIALMENTE INDICADAS	ESQUEMAS	PROFISSIONAIS POR ÁREA DE ATUAÇÃO*										
		Saúde	Alimentos e bebidas	Militares, policiais e bombeiros	Dejetos e águas contaminadas	Crianças	Animais	Profissionais do sexo	Profissionais administrativos	Profissionais da aviação	Profissionais que viajam muito	Manicures e pedicures
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) ⁽¹⁾	Dose única.	sim	-	sim	-	sim	-	sim	-	sim	sim	-
Hepatites A, B ou A e B ^(2;3)	<i>Hepatite A</i> Duas doses, com intervalo de seis meses após a primeira	sim	sim	sim	sim	sim	-	sim	-	sim	sim	-
	<i>Hepatite B</i> Três doses, com intervalos de um mês entre a primeira e a segunda e de cinco meses entre a segunda e a terceira	sim	-	sim	sim	-	-	sim	-	sim	sim	sim
	<i>Hepatite A e B</i> Três doses, com intervalos de um mês entre a primeira e a segunda e de cinco meses entre a segunda e a terceira											
HPV	Para mulheres com até 26 anos de idade. Três doses, com intervalos de dois meses entre a primeira e a segunda e de quatro meses entre a segunda e a terceira.	-	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-
Vacinas contra difteria, tétano e coqueluche	<i>Com esquema de vacinação básica completo</i> Reforço com dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e após, uma dose de dT (vacina dupla bacteriana do tipo adulto) a cada dez anos.	sim	sim	sim	sim	sim	sim	-	-	sim	-	sim
	<i>Com esquema de vacinação básica incompleto</i> Uma dose de dTpa (tríplice bacteriana acelular do tipo adulto) e uma ou duas doses de dT (vacina dupla bacteriana do tipo adulto).											
Varicela (catapora) ⁽⁴⁾	A partir de 13 anos de idade: duas doses com intervalo de dois meses	sim	-	sim	-	sim	-	-	-	sim	-	-
Influenza (gripe)	Dose única anual	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
Antimeningocócica C conjugada	Dose única	sim	-	sim	-	sim	-	-	-	sim	-	-
Febre amarela ⁽⁴⁾	Uma dose de dez em dez anos	-	-	sim	-	-	-	-	-	sim	-	-
Raiva (vacina obtida em cultura de células)	Três doses: a segunda sete dias depois da primeira e a terceira 14 a 21 dias depois da segunda	-	-	-	-	-	sim	-	-	-	-	-

* **Profissionais da área da saúde:** médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, patologistas e técnicos de patologia, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, pessoal de apoio, manutenção e limpeza de ambientes hospitalares, maqueiros, motoristas de ambulância, técnicos de RX e outros profissionais que freqüentam assiduamente os serviços de saúde, tais como representantes da indústria farmacêutica. **Profissionais que lidam com alimentos e bebidas:** profissionais que trabalham em empresas de alimentos e bebidas – cozinheiros, garçons, atendentes, pessoal de apoio, manutenção e limpeza, entre outros. **Profissionais que lidam com dejetos e/ou águas potencialmente contaminadas:** mergulhadores, salva-vidas, guardiões de piscinas, manipuladores de lixo e/ou esgotos e/ou águas fluviais, e profissionais da construção civil. **Profissionais que trabalham**

com crianças: professores e outros profissionais que trabalham em escolas, creches e orfanatos. **Profissionais que entram em contato freqüente ou ocasional com determinados animais:** veterinários e outros profissionais que lidam com animais, e também os freqüentadores e visitantes de cavernas. **Profissionais do sexo:** pessoas consideradas de risco para as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e doenças infecciosas ainda não controladas em outros países do mundo. **Profissionais administrativos:** que trabalham em escritórios, fábricas e outros ambientes geralmente fechados. **Profissionais que viajam muito:** aqueles que por viajarem muito para o exterior expõem-se ao risco de adquirir doenças infecciosas não controladas em outros países. **Profissionais da aviação:** pilotos e comissários de bordo. **Manicures e pedicures.**

1. Vacinas contra-indicadas para os imunodeprimidos: todas as vacinas vivas (contra a poliomielite oral, a varicela, o sarampo, a rubéola, a caxumba e a febre amarela), e a vacina BCG; em pessoas com imunodepressão leve, algumas dessas vacinas podem ser indicadas.

2. A vacinação combinada contra as hepatites A e B é preferível à vacinação isolada contra as hepatites A e B, exceto quando o resultado de teste sorológico indique presença de imunidade contra uma delas.

3. Esquemas especiais de vacinação contra a hepatite B: a) imunocomprometidos e renais crônicos: dobro da dose usual, ou seja, 2ml = 40mg, em três aplicações por via intramuscular; b) imunocompetentes com alto risco de exposição: dose usual, ou seja, 1ml = 20mg, em quatro aplicações por via intramuscular, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda, de um mês entre a segunda e a terceira, e de seis meses entre a terceira e a quarta.